

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

# **Hypochlorit - SPEIKO<sup>®</sup>**

5,25 %, Dentallösung  
Wirkstoff: Natriumhypochlorit 5,25 % (M / M)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Hypochlorit-SPEIKO jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Zahnarzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einem Tag keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Zahnarzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Zahnarzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Hypochlorit-SPEIKO und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hypochlorit-SPEIKO beachten?
3. Wie ist Hypochlorit-SPEIKO anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hypochlorit-SPEIKO aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST HYPOCHLORIT-SPEIKO UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Hypochlorit-SPEIKO ist ein Mittel zur Abtötung von Krankheitserregern (Antiseptikum). Es dient der Reinigung und Desinfektion von Wurzelkanälen.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON HYPOCHLORIT-SPEIKO BEACHTEN?**

#### **Hypochlorit-SPEIKO darf nicht angewendet werden:**

bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Chlor und bei Öffnung im Knochen an der Wurzelspitze (offenem Foramen apicale).

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Hypochlorit-SPEIKO ist erforderlich:**

Aufgrund der stark ätzenden Wirkung von Natriumhypochlorit auf lebendes Gewebe ist der Kontakt von Natriumhypochlorit-Lösung mit Schleimhaut, Haut, und Augen zu vermeiden. Ebenso darf die Lösung nicht in das periapikale Gewebe eingebracht werden (unbedingt auf langsame Applikation ohne Druck und auf vollständige und rasche Absaugung der Spüllösung achten), da dies zu schweren und nicht vollständig reversiblen Läsionen führen könnte.

### **Bei Anwendung von Hypochlorit-SPEIKO mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Zahnarzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Zahnarzt oder Apotheker um Rat.

Bitte informieren Sie Ihren Zahnarzt über eine eventuell bestehende Schwangerschaft.

Für die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit sind keine Einschränkungen bekannt.

## **3. WIE IST HYPOCHLORIT-SPEIKO ANZUWENDEN?**

Hypochlorit-SPEIKO wird ausschließlich durch den Zahnarzt angewendet.

Die benötigte Menge an Hypochlorit-SPEIKO richtet sich nach den lokalen Gegebenheiten. Während der Wurzelkanalbehandlung wird die Natriumhypochlorit-Lösung mit geeigneten Instrumenten und in geeigneter Technik (langsame Applikation ohne Druck, Absaugung der Spüllösung, Schutz von Zahnfleisch und Mundschleimhaut durch Verwendung von einer Schutzfolie aus Kunststoff (Kofferdam) zur spülenden Reinigung des Wurzelkanals benutzt.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Hypochlorit-SPEIKO Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Auf lebendes Gewebe wirkt Natriumhypochlorit stark ätzend.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Zahnarzt oder Apotheker mit.

## **5. WIE IST HYPOCHLORIT-SPEIKO AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf der Flasche nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Im Kühlschrank bei 4 - 8°C lagern. Die Flasche fest verschlossen halten und nicht dem Sonnenlicht aussetzen..

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:**

Nach Anbruch der Flasche beträgt die Dauer der Haltbarkeit 6 Wochen im Kühlschrank bei 4 - 8°C.

Mit einem Absinken der Natriumhypochlorit-Konzentration nach Anbruch ist zu rechnen. Restmengen an Hypochlorit-SPEIKO können mit Wasser stark verdünnt in den Abfluß gegeben werden. Restentleerte und mit Wasser ausgespülte Flasche kann in den Hausmüll gegeben werden.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was Hypochlorit-SPEIKO enthält:**

Der Wirkstoff ist: Natriumhypochlorit

100 ml (entsprechend 110,60 g) enthalten:

Natriumhypochlorit-Lösung 6 % (M/M) 83,283 ml (=96,775 g)

Endkonzentration Natriumhypochlorit = 5,25 % (M/M)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser

**Wie Hypochlorit-SPEIKO aussieht und Inhalt der Packung:**

Kunststoffflasche mit 30 ml Dentallösung

Kunststoffflasche mit 100 ml Dentallösung

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

SPEIKO- Dr. Speier GmbH

Postfach 7204

D-48039 Münster

Telefon 0251/789040

Telefax 0251/7890422

e-mail: [info@speiko.de](mailto:info@speiko.de) [www.speiko.de](http://www.speiko.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2008.**