

**SPEIKO - Dr. Speier GmbH**

**Gebrauchsinformation**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



## **Tamponade 2000**

Wirkstoff Iodoform

### **Zusammensetzung:**

100 g Verbandstoff enthalten:

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

Iodoform 50,0 g

**Sonstiger Bestandteil:**

Baumwolle

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Packung mit 1 cm x 5 m mit Gaze / Verbandstoff      Artikel-Nr. 1062

Packung mit 2 cm x 5 m mit Gaze / Verbandstoff      Artikel-Nr. 1063

### **Stoff- oder Indikationsgruppe, Wirkungsweise**

Desinfizierendes Dentalarzneimittel.

### **Anwendungsgebiete:**

Zur Blutstillung und Desinfektion nach Extraktionswunden und zur Behandlung der Dentitio difficilis.

### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie Tamponade 2000 nicht anwenden?*

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf Tamponade 2000 nicht angewendet werden.

### **Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

*Welche Vorsichtsmassnahmen müssen beachtet werden?*

Vorsichtsmassnahmen müssen nicht beachtet werden.

### **Wechselwirkungen:**

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Tamponade 2000?*

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Keine bekannt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die Anwendung erfolgt durch den Zahnarzt.

Die Länge des Streifens Tamponade 2000 sollte so gewählt werden, dass die Extraktionswunde vollständig ausgefüllt wird. Bei Dentitio difficilis wird die Länge des Streifens so gewählt, dass mit dem Tamponadenstopfer der Streifen ohne große Krafteinwirkung appliziert werden kann.

Die Dauer der Anwendung bestimmt der behandelnde Zahnarzt.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung:**

*Was ist zu tun, wenn Tamponade 2000 in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?*

Fälle von Überdosierung wurden bisher nicht bekannt.

### **Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Tamponade 2000 auftreten?*

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Keine bekannt.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

*Wie ist Tamponade 2000 aufzubewahren?*

**Achten Sie stets darauf, dass Sie Tamponade 2000 so aufbewahren, dass sie für Kinder nicht zu erreichen sind!**

### **Apothekenpflichtig!**

#### ***Hinweis:***

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Stand der Information: April 2001

---

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**SPEIKO®- Dr. Speier GmbH Postfach 7204 D-48039 Münster  
Telefon 0251/789040 Telefax 0251/7890422 e-mail: info@speiko.de**

Printed in Germany Imprimé en Allemagne